

おとな 成人 ワクチン接種スケジュール



2023年4月版

ワクチン名	接種回数	接種時期										65歳	70歳	75歳	80歳	85歳
		20歳 - 49歳					50歳 - 59歳									
mRNAワクチン 新型コロナ	臨時															
不活化ワクチン B型肝炎	任意	3回														
不活化ワクチン 肺炎球菌(PCV13)	任意	1回														
不活化ワクチン 肺炎球菌(PPSV23)	定期	1回														
不活化ワクチン 三種混合(DPT:ジフテリア・百日咳・破傷風)	任意															
不活化ワクチン 破傷風トキソイド	任意	3回														
生ワクチン 麻しん・風しん(MR)	任意	2回														
生ワクチン おたふくかぜ	任意	2回														
生ワクチン 水痘(水痘・帯状疱疹)	任意	水痘2回 帯状疱疹1回														
不活化ワクチン 帯状疱疹	任意	2回														
不活化ワクチン 日本脳炎	任意	3回														
不活化ワクチン インフルエンザ	定期	毎年秋に1回														
不活化ワクチン HPV(ヒトパピローマウイルス)	任意	2価3回														
	任意	4価3回														
	任意	9価3回														
不活化ワクチン 髄膜炎菌(4価)	任意	1回 (リスクが高い人2回)														
不活化ワクチン A型肝炎	任意	3回														

- 不活化ワクチン 定期 法律に定められた期間で接種した場合は無料(公費負担)
- 生ワクチン 任意 接種費用は自己負担(自治体によっては接種費用の助成があります)ですが、ワクチンの必要性は定期と同じです
- mRNAワクチン 臨時 無料(公費負担)

- 定期接種の推奨期間
- 定期接種の可能期間
- 任意接種の推奨期間
- 任意接種の可能期間
- 臨時接種の推奨期間



おとな 成人 ワクチン接種スケジュール



2023年4月版

ワクチン名	接種間隔	対象者・注意事項
新型コロナ	5歳- ①-②の間は3週以上あける ②-③の間は3か月以上あける	生後6か月以降全年齢接種可能
B型肝炎	①-②の間は4週以上あける ①-③の間は20週以上あける	・ハイリスク者：(医療従事者、透析患者、海外長期滞在者など) ・予防したい人はだれでも
肺炎球菌 (PCV13)		高齢者または肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高い人
肺炎球菌 (PPSV23)	前回の接種から5年以上あける	定期： ・2023年度末までは、65・70・75・80・85・90・95-100歳になる人 ・60歳以上で心臓・腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人 およびHIVウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人 ・過去に接種歴がない人 接種推奨： (1) 脾臓摘出した人の肺炎球菌予防(健康保険適用あり) (2) 鎌状赤血球症、脾機能不全、心臓・呼吸器の慢性疾患、腎不全、肝機能障害、糖尿病、慢性髄液漏等の基礎疾患のある人、免疫抑制剤治療予定者(治療開始まで14日以上の余裕のある場合)
三種混合 (DPT,DTaP : ジフテリア、百日咳・破傷風)	接種歴が3回未満の人 ①-②の間は3-8週以上あける ①-③の間は12-18か月あける 接種歴が3回以上の人 10年ごとに1回接種	破傷風トキソイドまたは三種混合ワクチンの接種歴が3回未満の人：破傷風トキソイドを計3回になるまで接種 3回以上の人：前回の接種から10年ごとに破傷風トキソイドを1回接種 ・諸外国では、10年ごとの接種のうち、百日咳予防のため1回以上を破傷風トキソイドからTdapに置換することを推奨 ・注意：Tdapは日本未承認のワクチン 日本のDTaPは破傷風トキソイド含有量がTdapの半分 ・外傷後の破傷風トキソイドの接種は、外傷の程度と接種歴に準じる ・1967年以前生まれの人は定期接種になかったため、破傷風予防ワクチン接種歴のない人が多い
破傷風 トキソイド		
麻しん・風しん (MR)	①-②の間は1か月以上あける	定期 風しん第5期： 1962年4月2日から1979年4月1日生まれの男性 (2024年度末まで) 接種推奨：2回の接種歴がないかつ感染歴のない人 注意：1990年度以前の生まれは、定期接種での2回の接種がない

ワクチン名	接種間隔	対象者・注意事項
おたふくかぜ	①-②の間は1か月以上あける	2回の接種歴がないかつ感染歴のない人
水痘 (水痘・帯状疱疹)	①-②の間は1か月以上あける	水痘予防目的では、2回の接種歴がないかつ感染歴のない人 帯状疱疹予防目的では、50歳以上
帯状疱疹	①-②の間は6か月あける	50歳以上
日本脳炎	①のあと1-4週後に②、その1年後に③	・接種歴が3回ない人：3回接種 ・接種歴が3回ある人：日本脳炎流行地へ渡航する際に1回 注意：北海道は2016年4月から小児に定期接種開始
インフルエンザ		定期：・65歳以上 ・60歳以上65歳未満で心臓・腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人 およびHIVウイルスにより日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人 任意：予防したい人はだれでも
HPV (ヒトパピローマウイルス)	①-②の間は1か月以上あける ①-③の間は6か月以上あける 標準的な接種ができなかった場合、①-②の間は1か月以上、①-③の間は5か月以上、かつ②-③の間は2か月半以上あける	2価ワクチン 任意：10歳以上の女性 ①-②の間は2か月以上あける ①-③の間は6か月以上あける 標準的な接種ができなかった場合、①-②の間は1か月以上、②-③の間は3か月以上あける 4価・9価ワクチン 任意(4価)：9歳以上の男女 任意(9価)：9歳以上の女性
髄膜炎菌 (4価)	リスクが高い人 ①-②の間は8週以上あける	2歳以上55歳以下 (1) 髄膜炎菌感染症流行地域へ渡航する人 (2) 学校の寮などで集団生活を送る人、送る予定の人 (3) マスクギャザリングイベントに参加する人 (4) リスクが高い人(HIV感染症、補体欠損症、無脾症、エクリズマブ治療患者など)
A型肝炎	①-②の間は2-4週あける ①-③の間は24週以上あける	任意：A型肝炎流行地へ渡航する人 予防したい人はだれでも



一般社団法人
日本プライマリ・ケア連合学会
Japan Primary Care Association

一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会 (JPCA) / 感染症委員会ワクチンチーム

